

# Biopect Lussolin 25

Importeur  
Hygline GmbH  
Hinterdorfstrasse 10  
CH-3550 Langnau - Switzerland  
T 079 410 55 20 info@hygline.ch

## Beschreibung

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Schweine, Lämmer und Zicklein.

## Zusammensetzung

Obsttrester, getrocknet (Apfel, Zitrus)\*, Traubenzucker\*, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat 6,0%, Flohsamenschalen\*, Maltodextrin\*, Kartoffelstärke\*, Zichorienpulver\*, Johannisbrotpulver\*, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid.

\*) Kohlenhydratquellen

## Zusatzstoffe

<b>Technologische:</b>
1a262 – Natriumdiacetat
1k281 – Natriumpropionat

## Analytische Bestandteile

Rohprotein	3,5%
Rohfett	1,0%
Rohfaser	8,0%
Rohasche	19,0%
Lysin	0%
Methionin	0%
Natrium	5,9%
Kalium	1,6%
Chloride	5,3%

## Physische spezifikationen

Schüttdichte	Ca. 550g/l
Farber	Hellbraun
Geruch	Schwach
Form	Trockenes Pulver

## Verpackung

Verpackung	Waren-Nr.	Eimer/ Krt.	Krt./ Palette
Muster	5020101005	12	42
1,0 kg	5020101010	10	28
2,5 kg	5020101025	4	40
5,0 kg	5020101050	2	42
20 kg sack	5020101250	20 Säcke	per pallet

## Anwendung

Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).

## Dosierung

Generell wird bei Verdauungsstörungen 1 g biopect pro kg Lebendgewicht zweimal täglich über 3-5 Tage verabreicht. Bei Gefahr von Verdauungsstörungen wird die halbe Menge während 2-3 Tage verabreicht.

## Kälber:

**Leichter Fälle:** 50 g (ca. 1 Messbecher) biopect, in 2 Liter ca. 40°C warme Milch eingerührt, zweimal täglich während 3-5 Tage geben.

**Mittelschwere bis schwere Fälle:** Die Dosis kann im Laufe der ersten 24 Stunden, abhängig von der Schwere der Verdauungsstörungen, bis zu 4-mal gegeben werden. In den folgenden Tagen wird biopect wie bei leichten Fällen in Milch gegeben.

**In Wasser:** Wenn es gewünscht ist, dass biopect in Wasser gegeben wird, wird die Dosis verdoppelt: 100 g in 2 Liter ca. 40°C warmes Wasser eingerührt bei den ersten 2 Gaben. Danach wird biopect wie bei leichtem Fällen in Milch gegeben. Die angegebenen Dosen gelten für ein Kalb von ca. 50 kg. Die Dosis je nach Gewicht des Kalbes erhöhen bzw. reduzieren.

**Schweine:** Geben Sie 50 g biopect pro 2 Liter Milchaustauscher oder 50 g biopect pro Liter Wasser. Biopect als Zugabe auf das Futter. Geben Sie 1 g pro kg Lebendgewicht zweimal täglich über 3-5 Tage.

**Lämmer und Zicklein:** 50 g biopect (ca. 1 Messbecher) pro 2 Liter ca. 40°C warme Milch zweimal täglich über 3-5 Tage.

## Haltbarkeit

Mindestens haltbar bis 2 Jahre nach dem Herstellungsdatum.

## Lagerung

Trocken, in verschlossener Originalpackung.